

# 维生素E软胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用!

## 【药品名称】

通用名称:维生素E软胶囊

英文名称:Vitamin E Soft Capsules

汉语拼音:Weishengsu E Ruanjiaonang

【成份】 本品每粒含维生素E(天然型)50毫克。辅料为明胶、甘油、精制玉米油。

【性状】 本品内容物为淡黄色至黄色的油状液体。

【作用类别】 本品为辅助用药类非处方药药品。

【适应症】 用于心、脑血管疾病及习惯性流产、不孕症的辅助治疗。

【规格】 50毫克(天然型)

【用法用量】 口服,成人,一次1~2粒,一日2~3次。

【不良反应】 长期过量服用可引起恶心、呕吐、眩晕、头痛、视力模糊、皮肤皴裂、唇炎、口角炎、腹泻、乳腺肿大、乏力。

【禁忌】 对本品过敏者禁用。

## 【注意事项】

1.本品为辅助治疗药,第一次使用本品前应咨询医师,治疗期间应定期到医院检查。

2.由于维生素K缺乏而引起的低凝血酶原血症患者慎用。

3.缺铁性贫血患者慎用。

4.如服用过量或出现严重不良反应,应立即就医。

5.对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

6.本品性状发生改变时禁止使用。

7.请将本品放在儿童不能接触的地方。

8.如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

## 【药物相互作用】

1.本品可促进维生素A的吸收、利用和肝脏贮存。2.降低或影响脂肪吸收的药物如考来烯胺、新霉素以及硫酸铝等,可干扰本品的吸收,不宜同服。3.口服避孕药可以加速维生素E代谢,导致维生素E缺乏。4.雌激素与本品并用时,如用量大、疗程长,可诱发血栓性静脉炎。5.本品避免与双香豆素及其衍生物同用,以防止低凝血酶原血症发生。6.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品参与体内一些代谢反应。能对抗自由基的过氧化作用,可抗衰老、保护皮肤,还能增强卵巢功能、防止习惯性流产。

【贮藏】 遮光,密封,在干燥处保存。

【包装】 塑料瓶装,30粒/瓶;60粒/瓶。

【有效期】 30个月

【执行标准】 《中国药典》2015年版二部。

【批准文号】 国药准字H20003538

【说明书修订日期】 2019年06月11日



持有人:浙江医药股份有限公司

持有人地址:浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号

生产企业:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

生产地址:浙江省新昌县城关镇新昌大道东路98号

网址:www.zmc-china.com 邮编:312366

电话:0575-86026388 传真:0575-86026388

如有问题可与持有人联系。